

# ロタウイルスワクチン



**対象者**ロタリックス:出生 6 週間 0 日後～24 週 0 日後になるまで  
ロタテック:出生 6 週間 0 日後～32 週 0 日後になるまで

## 👉ヒブが原因で起こる病気

ロタウイルスワクチンの副反応の1つに腸重積症があります。この腸重積症が起こりにくい低い月齢で接種する為、他のワクチンと比べ接種できる期間が非常に短いので注意が必要です！初回接種は出生 14 週 6 日後までに受ける必要があります。(※15 週以降の接種については、安全性が確立されていません。)


## 👉 ロタウイルスとは

口から侵入したウイルスが腸管に感染して発症します。感染力が非常に強く、手洗いや消毒などをしっかりしても、感染予防することが難しいため、乳幼児のうちにほとんどの子どもが感染します。下痢や嘔吐は 1 週間程度で治りますが、下痢・嘔吐が激しくなると、脱水症状を起こす場合もあり、乳幼児の急性胃腸炎の入院の中で最も多い感染症です。一生のうちに何度も感染するウイルスですが、初めてロタウイルスに感染した時は特に重症化しやすく、まれに脳や腎臓に影響を及ぼすこともあり、注意が必要です。  
生後すぐに感染する場合もあるので、ワクチンの接種は、早くはじめて早く完了させましょう。

## 👉 腸重積症とは

腸が腸に入り込み、閉塞状態になることです。0 歳児の場合、ロタウイルスワクチンを接種しなくても起こる病気で、もともと 3～4 か月ぐらいから月齢が上がるにつれて多くなります。いちごゼリー状の血便、5～10 分おきに不機嫌で顔色が悪くなるなどの症状が見られ、手術が必要な場合もあります。治療が遅れると閉塞した腸管が腐ったり、腐った腸から全身に菌が入り込み重篤な感染症を引き起こす事もあります。

<予防接種スケジュール> 飲むタイプの生ワクチンです。(医療機関で相談し、どちらかを選んでください)



⚠️ 赤ちゃんのお腹がいっぱいと、上手にワクチンを飲めない事があるので、接種前 30 分ほどは授乳を控える事をすすめます。またワクチン接種後 2 週間ほどは、赤ちゃんの便の中にワクチンのウイルスが含まれる事があります。おむつ交換の後など、丁寧に手を洗ってください。